


Государственный Научный Центр Колопроктологии



АНАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА

Информационный листок для пациентов




Что такое анальная трещина?

Анальная трещина это линейный разрыв слизистой оболочки анального канала (как правило, на задней стенке). Это заболевание может появиться в любом возрасте, но более характерно для молодых людей. Трещины могут появляться из-за частого стула, поноса или наоборот, запоров, при прохождении через задний проход твердого стула. Однако чаще возникают без видимых причин. Симптомы трещины — боль, особенно во время дефекации, иногда кровотечения.



А



Б

Как можно лечить трещину?

По крайней мере, у половины больных после нормализации стула и применения специальных мазей трещины заживают самостоятельно. Это, так называемые, острые трещины. Хронические трещины не поддаются консервативному лечению, часто вызывают спазм анального сфинктера (мышцы, которая замыкает задний проход и контролирует отхождение газов и стула) и могут потребовать хирургического лечения.

Консервативное лечение

Обычно применяются нитратные мази (0,2%), которые вызывают расслабление анального сфинктера и создают условия для заживления трещины. В последнее время также применяется мазь Дилтиазем, которая также расслабляет сфинктер и эффективна при трещине.

В чем заключается операция?

Обычно при этом заболевании выполняют иссечение трещины и сфинктеротомию, суть которой состоит в том, что производится рассечение одной из порций анального сфинктера. Это вмешательство приводит к расслаблению сфинктера, снимет болевой синдром и создает условия для заживления. Пересечение этой мышцы обычно не приводит к нарушению держания кала и не увеличивает пребывание в стационаре.

Контакты

Государственный Научный Центр колопроктологии
Салям Адиля, 2
Москва, 123423

www.gnck.ru

Время работы поликлиники
Понедельник – пятница
9:00 – 14:00 (без предварительной записи)